AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORET
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO -
☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 122
du 6 JUIN 1988

- *VIGNE* = *mildiou, oïdium, cochenille farineuse.*
- *AGRUMES* = *Ne pas traiter pour le moment.*
- *ARBRES FRUITIERS* = *psylle du poirier, tordeuse orientale du pêcher,*

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA
Directeur-Gérant : J.C. COQUET
Abonnement Annuel : à
Régisseur de Recettes
Publication Périodique
CPPAP N° 1769 - AD
I S S N
07 39 - 9633

VIGNE

** *Mildiou*

Des taches de **mildiou** *sont visibles sur feuilles et grappes. Les foyers sont nombreux sur toute la Plaine Orientale.*

Il est impératif de maintenir la protection, compte-tenu des conditions climatiques instables.

** *Oïdium*

Il est toujours présent sur cépages sensibles.

Préférez un soufrage en pleine floraison.

Il a une action favorable sur la fécondation et une action secondaire efficace contre les acariens.

** *Cochenilles farineuses de la vigne*

Les foyers sont nombreux. Souvent limités à quelques pieds, ils

se signalent par la fumagine de couleur noire qui s'est développée sur le tronc et les bras.

Un premier traitement est nécessaire dans la semaine du 13 au 18 Juin. Préférez :

ULTRACIDE
EKALUX
ou les produits à base de parathion.

AGRUMES

== Pour les traitements contre les cochenilles virgules et serpettes et cochenilles noires de l'olivier, il est encore trop tôt pour intervenir.

== En ce qui concerne les Aleurodes, il est inutile de traiter pendant la période de vol. Attendre un prochain Bulletin.

ARBRES FRUITIERS

** Psylle du poirier

Les jeunes larves sont visibles. Intervenir sur les jeunes pousses avec :

amitraze	TUDY, MAITAC
phosmet	IMIDAN

** Tordeuse orientale du pêcher

Un traitement contre la tordeuse pourra être effectué dès réception du Bulletin, notamment en vergers infestés en 1987. Des débuts d'attaque sont déjà visibles.

Utilisez :

fenitrothion	N. S.
fluvalinate	KLARTAN
phosalone	ZOLONE
deltaméthrine	DECIS
méthomyl	LANNATE, METOVER
méthidathion	ULTRACIDE

BIEN RESPECTER LES DELAIS AVANT RECOLTE